

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CIRUELO

Verdial

Tamaño: Medio.

Forma: Redondeada. Achatada en ambos polos.

Zona pistilar: Deprimida o formando cubeta amplia y poco acusada. **Punto pistilar:** Pequeño, amarillento. Superficial, situado sobre cara plana o en una depresión en la parte dorsal.

Sutura: Medianamente perceptible. Línea verdosa, transparente, de anchura variable, generalmente fina en la mitad superior y ensanchándose hasta el tercio inferior. Situación superficial excepto en ambos polos.

Cavidad del pedúnculo: Amplia, medianamente profunda. Bastante rebajada en la sutura y menos en el lado opuesto. En ambos lados el rebajado es suave. **Pedúnculo:** Longitud media. Grosor variable. Leñoso y verdoso. Pubescencia fina, poco apreciable.

Piel: Pruina abundante, muy fina, blanquecina. No se aprecia pubescencia. **Color:** Verde o verde amarillento con estrías amarillentas muy marcadas partiendo de la cavidad peduncular. En la zona ventral se forman manchas atigradas más verdosas. Sin chapa, con zonas dorado cobrizas. Punteado abundante, bastante visible, muy menudo y blanquecino alrededor del punto pistilar, en el resto de mayor tamaño y aureolado de verde, excepto en la zona peduncular que queda libre de punteado.

Carne: Amarillo verdosa, transparente. Medio firme, jugosa. **Sabor:** Dulce, típico de Reina Claudia aunque algo soso.

Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico. Surcos generalmente bien marcados. Superficie semi lisa, muy suave.

